

MURAL EDUCATIVO

RETENÇÃO PROLONGADA DE DENTES DECÍDUOS



Aluna: Fernanda Verdant

Tutora: Inger Tuñas

RETENÇÃO PROLONGADA

A retenção prolongada é quando o dente decíduo (dente de leite) permanece na boca por um tempo maior do que o padrão.



Esta é uma condição muito comum em crianças, e pode ser evitada com o acompanhamento do odontopediatra.



CAUSAS DA RETENÇÃO PROLONGADA

A retenção pode acontecer devido a diversos fatores, como os hereditários, ambientais e locais.

O motivo mais comum é a ausência da *rizólise*.


A reabsorção das raízes decíduas pela presença do permanente sucessor (*rizólise*) não acontece e assim, o decíduo se mantém e o permanente erupciona a frente ou atrás dele.



CAUSAS DA RETENÇÃO PROLONGADA

ALÉM DISSO, PODEMOS LISTAR:

- Ausência do dente permanente;
- Permanente erupcionando ("nascendo") em local distinto;
- Ausência de espaço na boca, impedindo a erupção do permanente;
- Traumas no dente de leite.





INCISIVOS PERMANENTES

(DENTES CENTRAIS PERMANENTES)




INCISIVOS DECÍDUOS

(DENTES CENTRAIS DE LEITE)

QUAIS SÃO AS CONSEQUENCIAS?


Caso a retenção prolongada não seja devidamente abordada, podem ocorrer:

- Alterações na oclusão;
- Desenvolvimento de lesões císticas;
- Reabsorção de dentes adjacentes.




COMO TRATAR ?

- Extração do dente retido;
- Controle do paciente até a total erupção dos dentes permanentes.



IMPORTANTE!



É importante que
as consultas com o
Odontopediatra
sejam feitas
periodicamente
após o nascimento
do primeiro dente
de leite do bebê.

SIGA O PET EM SUAS DEMAIS CONTAS




SPOTIFY: PETCAST - PET Odontologia UFRJ



PÁGINA NO FACEBOOK: PET Odontologia UFRJ



YOUTUBE: PET Odontologia UFRJ



REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

