


MURAL EDUCATIVO

AVULSÃO DENTÁRIA



Aluna: Aléxia da Conceição
Tutora: Inger Tuñas

O QUE É AVULSÃO DENTÁRIA?

É um tipo de traumatismo que atinge um ou mais dentes, os quais, ficam completamente fora do alvéolo (espaço onde o dente fica na boca).



Alvéolo
dentário

AVULSÃO DENTÁRIA

Ocorre principalmente em crianças.

E, quando ocorre em dentes permanentes o tratamento de escolha - quando possível - é a manutenção do próprio dente na boca, que é realizada através do reposicionamento e contenção do dente pelo cirurgião dentista.



Fonte da imagem:

<https://www.jornaldentistry.pt/file/uploads/a12f730910722add3b62f157ce0a1be8.pdf/>

O QUE FAZER SE ISSO ACONTECER COMIGO?

1º - Procure o dente.

2º - Limpe-o em solução salina ou água corrente fria, mas não esfregue o dente e **NÃO** o segure pela **RAIZ**

3º - Reposicione o dente no alvéolo, fazendo uma leve pressão com os dedos.

4º - Procure atendimento odontológico de imediatamente.

5º - Mantenha o dente na posição até chegar ao dentista.



NÃO CONSIGO REPOSICIONAR O DENTE

Caso não consiga reposicionar o dente, armazene-o e leve-o consigo para o atendimento.

Alguns líquidos adequados para isso são:

- **Solução salina equilibrada de Hanks**
- Leite
- Soro fisiológico



NÃO CONSIGO REPOSICIONAR O DENTE

Nesses casos, procure ser atendido por um cirurgião-dentista em uma janela de **60 minutos** após o acidente.

Dentes que permanecem fora da boca por mais de 60 min têm pior prognóstico no longo prazo.



**O TEMPO ENTRE A
AVULSÃO E O
REIMPLANTE DENTAL É
DECISIVO NO SUCESSO,
BEM COMO O ESTADO
EM QUE OS DENTES
FORAM ARMAZENADOS.**

CHEGUEI NO DENTISTA, E AGORA?

Ao chegar ao atendimento é importante informar:

- **Como foi o acidente**

Irá auxiliar o dentista a verificar a causa, que em casos de desmaios podem ser por alterações sistêmicas.

- **Onde foi**

Esta informação guiará a conduta do profissional, principalmente com relação a necessidade ou não de medicamento.


- **Quando foi**

Auxiliará o profissional na projeção de um prognóstico.

COMO PREVENIR A AVULSÃO DENTÁRIA?

Devemos evitar que ocorram acidentes.

- Deve-se usar o cinto de segurança.
- Durante a prática de exercícios é importante utilizar protetores bucais.
- Deve-se observar crianças na piscina, que é uma área propensa a acidentes, por brincadeiras, mergulhos, ...
- As alterações de oclusão devem, sempre que possível, ser corrigidas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

RISSO, P. A., et al. Odontologia integrada na adolescência. 1ª edição. São Paulo: Santos editora , 2012.

UNA-SUS UFSC. Eventos agudos na atenção básica: Trauma dental. 1ª edição. Santa Catarina: Florianópolis , 2013.

Silva Junior, E. Z., et al Prognóstico e tratamento da avulsão dentária: relato de caso. Rev. cir. traumatol. buco-maxilo-fac. v. 15, n. 3, p. 39-42, jul. - set. 2015.

FOUAD, A. F., et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Wiley Online Library, 2020. Disponível em: <<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/edt.12573>> Acesso: 22/08/2021