

Dezembro vermelho

MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES COM AIDS



O que é a *AIDS: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida*

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, conhecida mundialmente como AIDS, é a manifestação clínica avançada da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), caracterizada por uma severa imunossupressão do hospedeiro, manifestando-se por uma grande variedade de sintomas e sinais clínicos, sendo muitos observados na boca. As manifestações bucais geralmente se apresentam no curso da doença e são facilmente identificadas e diagnosticadas.



Conhecendo o vírus

- ! TRATA-SE DE UM RETROVÍRUS, SENDO DENOMINADO DE HIV;
- ! APRESENTA ALTA TAXA DE MUTAÇÃO E RECOMBINAÇÃO GÊNICA;
- ! HÁ GRANDE VARIAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA;
- ! O VÍRUS HIV NÃO TEM CAPACIDADE DE SE REPRODUZIR SOZINHO, POR ISSO, AGE COMO UM PARASITA, INVADINDO AS CÉLULAS DO HOSPEDEIRO, EM ESPECIAL OS LINFÓCITOS T CD4+.

IMPORTANTE

Nem todos os portadores do vírus HIV apresentam a doença AIDS

Transmissão do vírus



- 1** PELA VIA SEXUAL (TRATA-SE DE UMA IST);
- 2** POR ACIDENTES COM MATERIAIS BIOLÓGICOS;
- 3** TRANSFUSÃO SANGUÍNEA E HEMODERIVADOS;
- 4** PELO USO COMPARTILHADO DE SERINGAS;
- 5** POR TRANSMISSÃO VERTICAL, OU SEJA, DA MÃE PARA O FILHO DURANTE A GESTAÇÃO, NO MOMENTO DO PARTO E DURANTE O ALEITAMENTO.

IMPORTANTE

Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outros. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

DIAGNÓSTICO



- SABER PRECOCEMENTE DA DOENÇA É FUNDAMENTAL PARA AUMENTAR, AINDA MAIS, A SOBREVIVÊNCIA DO INDIVÍDUO ACOMETIDO PELO VÍRUS.
- A PRÁTICA DIÁRIA EM MUITOS PAÍSES, NOS CASOS DE SUSPEITA DE INFECÇÃO, MESMO QUE NA FASE PRIMÁRIA, É A REALIZAÇÃO DE TESTES DE RASTREIO DE ANTICORPOS, COMO TESTES RÁPIDOS OU UM ELISA, UMA VEZ QUE COMPREENDEM FERRAMENTAS FÁCEIS E ECONÔMICAS PARA DIAGNOSTICAR A INFECÇÃO PELO HIV.

❗ **Por se tratar de uma IST, o método principal de prevenção é o uso de camisinha.**

PEP SEXUAL:

- **O QUE É A PEP SEXUAL?**

PEP sexual (profilaxia pós-exposição sexual) é uma medida de prevenção que consiste no uso de medicamentos até 72 horas após a relação sexual a fim de reduzir o risco de transmissão do HIV (vírus da AIDS), quando ocorrer falha ou não uso da camisinha.

- **ONDE PROCURAR?**

A PEP sexual deve estar disponível nos Serviços de Atenção Especializada em HIV/AIDS, os SAE, segundo recomendação do Ministério da Saúde.

CAVIDADE ORAL

E A MANIFESTAÇÃO DA DOENÇA



- AS MANIFESTAÇÕES BUCAIS TÊM SIDO CONSIDERADAS COMO IMPORTANTES MARCADORES DO AVANÇO DA DOENÇA ENTRE PESSOAS INFECTADAS PELO HIV.
- HÁ O PREDOMÍNIO INFECÇÕES FÚNGICAS (CANDIDÍASE E QUEILITE ANGULAR), BACTERIANAS (DOENÇAS PERIODONTAIS E NECROSANTES), VIRAIS (HERPES SIMPLES E LEUCOPLASIA PILOSA ORAL) E NEOPLÁSICAS (SARCOMA DE KAPOSÍ).
- A LESÃO ORAL MAIS COMUM QUE PODE ESTAR ASSOCIADA À DOENÇA É A CANDIDÍASE ORAL.
- OS PACIENTES PORTADORES DO VÍRUS HIV QUE APRESENTAM MENOR NÍVEL SOCIOECONÔMICO, ESCOLAR, FAZEM MAIOR CONSUMO DE CIGARROS, DEPENDÊNCIA AO ÁLCOOL, MAIOR TEMPO DE INFECÇÃO E CARGA VIRAL ELEVADA PODEM ESTAR MAIS SUSCETÍVEIS A DESENVOLVEREM LESÕES BUCAIS.

HIV e Candidíase Oral

- Trata-se de uma infecção oportunista mais comum nos pacientes com HIV/AIDS.

- Traumas teciduais, favorecidos pela xerostomia, comum em indivíduos HIV positivos, são considerados condição importante para a infecção com cândida e diminuição de proteínas antimicrobianas.

- Há 3 tipos de manifestações clínicas da infecção por cândida: pseudomembranas, eritematoso e queilite angular.

- A candidíase bucal (principalmente através das formas pseudomembranosa eritematosa e a quelite angular) é uma lesão de fácil diagnóstico clínico.





Figura 1: CANDIDÍASE PSEUDOMEMBRANOSA Fonte: NEVILLE; Patologia Oral e Maxilofacial. 4ª ed. 2016.

Outras lesões associadas




DOENÇA PERIODONTAL

Alterações na microbiota oral, a partir da imunodeficiência, pode ocasionar o desenvolvimento de lesões de origem bacteriana, como gengivite e periodontite.



HERPES SIMPLES

Na mucosa oral de pacientes imunocomprometidos, as lesões vesiculares ocorrem, principalmente, na gengiva e no lábio.



SARCOMA DE KAPOSI

É a lesão neoplásica mais comum. As lesões duras no palato são as mais comuns, podendo interferir até mesmo na mastigação e causar perda dentária.

TRATAMENTO odontológico



- DEVE SER SEMPRE PLANEJADO E COM ACOMPANHAMENTO MÉDICO.
- O USO DE TERAPIA ANTI-RETROVIRAL ALTAMENTE POTENTE (HAART) É CAPAZ DE PROPORCIONAR ACENTUADA REDUÇÃO NA OCORRÊNCIA DE INFECÇÕES OPORTUNISTAS E NA PREVALÊNCIA DAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS.
- O USO DA HAART PODE PROPICIAR O AUMENTO NAS DOENÇAS DA GLÂNDULAS SALIVARES.
- É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O CONHECIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES BUCAIS EM PACIENTES HIV POSITIVOS PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE.


NA ODONTOLOGIA

A descoberta das manifestações bucais de forma precoce, através de um exame clínico bem minucioso, poderá indicar os primeiros sintomas da doença e auxiliar no tratamento, podendo, assim melhorar a qualidade de vida dos portadores do vírus HIV.



REFERÊNCIAS:

- 1 SILVA, Bruno Bitencourt da; COSTA, Lharissa Marrary Rocha. Manifestações orais em pacientes HIV positivos. 2019.
- 2 DOS SANTOS CAVASSANI, Valdinês Gonçalves et al. Candidíase oral como marcador de prognóstico em pacientes portadores do HIV. Rev Bras Otorrinolaringol, v. 68, n. 5, p. 630-4, 2002.
- 3 PAULIQUE, Natália Calegari et al. Manifestações bucais de pacientes soropositivos para HIV/AIDS. Archives of Health Investigation, v. 6, n. 6, 2017.
- 4 DE ARAÚJO, ROBERTO PEREIRA et al. Atendimento odontológico aos pacientes com HIV/AIDS. Revista de Odontologia Contemporânea, v. 2, n. 1, p. 28-36, 2018.
- 5 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cartilha AIDS e DSTs. 2014.



@PETODONTOLOGIAUFRJ